

فهرست داروهایی که بعد از مدت زمان معینی باید reassessment (ارزیابی مجدد) شوند :

نوع دارو	مدت تعیین شده	توضیحات
آنتی بیوتیک های خوراکی	۴ روز	بر اساس نتایج آزمایشگاهی و تصویربرداری های تشخیصی و نیز پاسخ بالینی بیمار در مورد ادامه درمان تصمیم گیری شود.
آنتی بیوتیک های تزریقی	۴ روز	بر اساس نتایج آزمایشگاهی و تصویربرداری های تشخیصی و نیز پاسخ بالینی بیمار در مورد ادامه درمان تصمیم گیری شود. از نظر تبدیل به آنتی بیوتیک خوراکی ارزیابی شود.
آنتی بیوتیک های موضعی، گوش، محلول خوراکی نمکین	۱۰ روز	بر اساس پاسخ بالینی بیمار، ارزیابی و بررسی مجدد (reassessment) شود.
آنتی کوآگولانت ها (هپارین، انوکسپارین)	۷ روز	
وارفارین	۱۴ روز	بر اساس فیدبک و نتیجه آزمایشات بیمار، ارزیابی مجدد شود.
کتورولاک	۵ روز	جهت پیشگیری از عوارض کلیوی و گوارشی.
پندین	۲ روز	جهت پیشگیری از تجمع متابولیت های سمی.

کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی مرکز