


دانشگاه علوم پزشکی اردبیل



واحد آموزش سلامت
بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

مراقبت‌های بعد از CD گذاری



کار گروه آموزشی به بیمار بخش نوروسرجری

تأیید کننده: «دکتر بهزاد اسکندر اوغلی»

متخصص جراحی مغز و اعصاب

کد سند: EM-EP-98

تاریخ تدوین: پاییز 1403

تاریخ ابلاغ: پاییز 1403

CD گذاری در کمر (فیوژن ستون فقرات) به معنای استفاده از وسایل جایگزین برای تصحیح انحنایی است که در ستون فقرات برخی از افراد به دلایل ناشناخته ایجاد شده است. انحنای ستون فقرات معمولاً به علت انحراف جانبی (به راست یا چپ)، قوز در آوردن، سرخوردگی در مهره‌ها که مادرزادی است و شکستگی‌ها ایجاد می‌شود.

آموزش به بیمار بعد از عمل CD گذاری

متوسط زمان لازم برای بهبود زخم جراحی حدوداً دو هفته از زمان جراحی می‌باشد که بسته به سلامت عمومی بیمار، وضعیت تغذیه و ابتلا به بیماری‌های دیگر مخصوصاً دیابت که ممکن است روند بهبودی زخم را طولانی کند.

از بخیه‌های محل عمل مراقبت بعمل آورید و محل بخیه‌ها را خشک و تمیز نگه دارید و با یانسمان خشک روی آن را بپوشانید. معمولاً بعد از ده روز تا دو هفته و اطمینان از جوش خوردن زخم بخیه‌ها کشیده می‌شوند. پس از عمل بهتر است تا زمان معلوم شده توسط پزشک معالج، زخم شما با آب در تماس نباشد. در صورتی که مدت زمان تعیین شده سپری شد و زخم شما توسط جراح تان دیده شد و از نظر ایشان خوب و قابل قبول بود، شما می‌توانید با خیال راحت استحمام کنید.

راه رفتن از روز دوم بعد عمل، به مدت زمان محدود بلامانع است و در روزهای بعد فعالیت را به تدریج و در حد تحمل افزایش دهید. پیاده‌روی یکی از بهترین تمریناتی است که می‌توانید بعد از جراحی کمر انجام دهید. دلیل این کار این است که راه رفتن باعث بهبود جریان خون در بدن می‌شود و از این طریق به شما کمک می‌کند تا روند اکسیژن‌رسانی و مواد مغذی به عضلات و بافت‌های ستون فقرات بهبود یابد.

حتماً روی تخت بخوابید. وقتی طاقباز می‌خوابید زیر سر و زانوهای بالش بگذارید تا فشار به کمر کاهش یابد، هنگام

غلطیدن عضلات شکم را منقبض کرده و در حالی که سر، شانه‌ها و لگن در یک امتداد هستند بچرخید به هر طرف که راحت تر هستید بخوابید، زانوهای را مختصری خم کنید و بین آنها بالش بگذارید. گذاشتن بالش زیر دست بالایی موجب کاهش فشار به کمر می‌شود. از خوابیدن روی شکم پرهیز کنید.



برای بلند شدن از تخت زانوهای را خم کرده و به پهلو بچرخید، سپس با کمک دست بالایی به تخت فشار بیاورید و تنه را بلند کنید همزمان پاها را به بیرون از تخت ببرید. برای برگشت به تخت عکس این روال را انجام دهید.



وجود کمر درد در محل عمل جراحی تا چند هفته پس از جراحی قابل انتظار است و نباید شما را نگران کند اگر درد تیر کشنده به پای تان کمتر شده یا بهبود یافته یعنی جراحی شما موفقیت‌آمیز بوده است. درد محل جراحی به تدریج رو به بهبود خواهد رفت، اما گزگز پاها که ممکن است از قبل عمل وجود داشته باشد و یا بعد از

عمل خود را نشان دهد احتمالاً زمانی بیش از یکی دو ماه برای بهبودی نیاز دارد.

بی حرکتی ثانویه به درد در پاها ممکن است سبب تورم مختصری در آنها شود که معمولاً با بالا قرار دادن پاها و خوابیدن در طول شب بهتر می شود. اما تورم شدید، دردناک، توام با قرمزی و سفتی در عضلات خصوصاً در یکی از پاها ممکن است نشانه اول ایجاد لخته در عروق باشد که مهم و گاهی خطرناک بوده و نیازمند توجه جدی و بررسی و درمان است.

اگر به هر دلیل مثل ضعف عضلات یا با صلاحدید پزشک لازم است استراحت مطلق داشته باشید چند مورد را در نظر بگیرید: حرکت پاها و ماساژ و ورزش آنها، استفاده از جوراب واریس، رژیم غذایی نرم، تزریق مرتب آمپول ضدانعقاد در صورت تجویز پزشک معالج، تغییر وضعیت خوابیدن به پشت یا دو پهلو بصورت متناوب و توجه به هر نوع قرمزی پوست در ناحیه باسن یا پاشنه پاها که می تواند اولین نشانه زخم بستر باشد.

از غذاهای حاوی سبزیجات و میوه جات تازه، گوشت کم چربی و لبنیات و رژیم غذایی سرشار از ویتامین سی و پروتئین استفاده کنید و به منظور جلوگیری از افزایش وزن به دلیل عدم تحرک پس از عمل، از مصرف (برنج، سیب زمینی، شیرینی جات، ماکارونی و چربی زیاد) خودداری کنید.

بعد از عمل جراحی پزشک معالج ممکن است، براساس صلاحدید داروهایی از جمله آنتی بیوتیک های خوراکی برای پیشگیری از عفونت، داروهای ضد التهاب برای کاهش درد محل جراحی و تسکین التهاب بافت های برش خورده، داروهای تقویت و تسکین دهنده ی بافت های عصبی تحریک شده، داروی تزریقی ضدانعقاد و مولتی ویتامین ها که به منظور تسریع در التیام زخم برای بیمار تجویز کند. داروها را بطور منظم و طبق دستور پزشک مصرف کنید از مصرف خودسرانه دارو در

صورت بروز درد خودداری کنید و از داروهایی که پزشک تجویز کرده استفاده کنید.

از بلند کردن اجسام سنگین، خم شدن یا چرخاندن ناگهانی کمر، پوشیدن کفش پاشنه بلند خودداری کنید. وزن خود را متعادل نگه دارید و فعالیت خود را به صورت تدریجی افزایش دهید. بهتر است در اولین ماه پس از عمل از رانندگی اجتناب کنید و تا سه ماه بعد از عمل از رانندگی طولانی پرهیز نمائید.

بعد از جراحی ستون فقرات پزشک متخصص استفاده از کمربند طبی بعد از عمل را تجویز می کند. این کمربند باعث ثابت و صاف ماندن ستون فقرات در زمان نقاهت و بهبود سریع بعد از عمل می شود. پس باید بیمار به صورت مداوم از آن روی کمر خود استفاده کند و فقط در شرایطی که پزشک متخصص به او اجازه داده است آن را باز کند.

12-7 روز پس از ترخیص جهت ویزیت به پزشک مراجعه نمایید.

به خاطر تسریع در روند بهبودی زخم از کشیدن سیگار پرهیز کنید.


استفاده از توالت فرنگی به جای توالت های سنتی نه تنها برای این مدت، بلکه برای تمام طول عمر توصیه می شود. چرا که میزان فشار وارده بر عضلات، مهره ها و دیسک های کمر در حالت چمباته بسیار زیاد است. بعد از عمل نماز را نشسته پشت میز بخوانید و مهر را بالا آورده و روی پیشانی قرار دهید.

بهتر است تا یک ماه و نیم بعد از عمل جراحی از فعالیت جنسی خودداری کنید. در مراجعه خود به جراحان که معمولاً در این زمان است سوالات خود را در این رابطه بپرسید.

ورزش و فیزیوتراپی بعد از عمل جراحی بسیار کمک کننده است و زمان شروع آن باید حتماً با

هماهنگی پزشک معالج باشد.

اگر مجبورید مدت طولانی روی صندلی بنشینید بهتر است هر نیم ساعت به بهانه های مختلف از جا برخیزید و راه بروید و به بدن خود حرکات کششی بدهید.



در چه صورت فوراً به پزشک خود مراجعه کنیم؟

- 1- هر نوع ترشح از محل عمل جراحی
- 2- هر نوع تورم غیرعادی در محل عمل یا پاها
- 3- تب بالا و مداوم بیش از دو روز
- 4- سردرد شدید
- 5- حساسیت به داروها مانند خارش و قرمزی پوست و علائم گوارشی شدید
- 6- احساس ناتوانی در دفع ادرار و بی اختیاری ادرار
- 7- درد شدید و پیشرونده در پاها خصوصاً همراه با احساس ضعف در حرکت آنها

گردآوری: زینب سلیمانی

در صورت نیاز به سایر مطالب آموزشی اسکن نمایید

